



آموزش سلامت

دریافت فراورده خونی



شماره سند: ۱/۱۱۴-ت/۳۲- پ	
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
کد بازنگری: ۰۰۱	تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۶/۰۵/۲۰

یا مدت کوتاهی پس از آن بیمار شود، خطر ابتلا به عفونت افزایش

می یابد. اگر سیستم ایمنی بدن شما پایین باشد و یا به شدت بیمار

باشید، خطر عوارض ابتلا به عفونت در شما بیشتر است.

بروز تب بعد از انتقال خون جدی نیست. تب، واکنش بدن در

برابر گلبول های سفید خون در خون انتقال یافته است. با این

حال، اگر بیمار حالت تهوع یا درد قفسه سینه را نیز تجربه

کند، می تواند نشانه یک واکنش جدی باشد. در صورت

وجود علائم یا عوارض جانبی دیگر، بیماران باید با پزشکان

خود مشورت کنند

*لطفاً بعد از روشن کردن اینترنت گوشی و گرفتن دوربین گوشی بر روی لینک زیر
کلیه اطلاعات مربوط به بیماری خود را دریافت کنید.*



منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود میتوانید به

صورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز روزهای

تعطیل به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل

فرمایید

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵ بیمارستان منتصریه

طبقه همکف کلینیک آموزش سلامت

شماره تماس: ۳۳۲۲۹۱۹۷۳

مرگ: اگر واکنش همولیتیک به اندازه کافی شدید باشد

احتمال مرگ وجود دارد. اما این عارضه به ندرت

رخ می دهد.

اضطراب: هنگامی که یک واکنش آلرژیک در حال

وقوع است ممکن است بیمار احساس اضطراب و یا

ترس داشته باشد.

ادرار خونین: همراه با اختلال عملکرد کلیه، خون در

ادرار بیمار می تواند شواهدی از عوارض انتقال خون

باشد.

تب: تب ناگهانی بلافاصله پس از انتقال خون ممکن

است نشانه واکنش آلرژیک قریب الوقوع باشد. درجه

حرارت بیمار همیشه باید قبل از تزریق بررسی شود.

تأکی کاردی: ممکن است ضربان قلب بیمار سریعتر از

حد طبیعی قبل از واکنش شود، به همین دلیل، علائم

حیات معمولاً بلافاصله قبل از تجویز خون کنترل می شود

افزایش خطر ابتلا به عفونت: اگر اهدا کننده خون،

هنگام اهدای خون بیماری خاصی داشته باشد

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از خودتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید .



عوارض انتقال خون: می تواند خفیف و جزئی باشد، اما

در موارد نادر احتمال بروز عوارض جدی در حین

دریافت خون هم وجود دارد. اگر قصد انتقال خون

دارید، ممکن است نگران عوارض مرتبط با خون

اهدایی باشید. در حالی که انتقال خون عوارض بسیار

کمی دارد و تأمین خون در بیشتر کشور ها بسیار ایمن

است، اما همیشه خطرات مرتبط با دریافت خون

وجود دارد. آزمایشات بیشماری که برای انتقال خون

صورت می گیرد در پیشگیری از انتقال بیماری های

عفونی موثر هستند.

انتقال خون یک روش درمانی بسیار رایج است.

برخی دلایلی که ممکن است بیمار نیاز به تزریق

خون داشته باشد

عبارتند از:

۱- انتقال خون برای بیمارانی که صدمات جدی ناشی از

تصادفات اتومبیل یا بلایای طبیعی را تجربه کرده اند استفاده می شود.

۲- افرادی که مبتلا به بیماری های **کم خونی**، مانند **سرطان**

خون یا بیماری کلیوی هستند اغلب به انتقال خون نیاز دارند.

۳- اکثر بیمارانی که یک عمل جراحی عمده انجام می دهند،

برای جایگزینی هرگونه خون از دست رفته در طی

جراحی، به انتقال خون نیاز دارند.

غالب بیمارانی که خون دریافت می کنند هیچگونه عارضه و

مشکلی ندارند. با این وجود، گاهی اوقات مشکلات جزئی تا

شدیدی در هنگام تزریق خون بروز می کند.

یک واکنش زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن بیماری

که خون را دریافت می کند بخواهد گلبول های قرمز انتقالی

را از بین ببرد.

به همین دلیل :

در طول تجویز، ممکن است از داروهایی جهت هر نوع پیشگیری از عوارض انتقال خون استفاده شود

نشانه یا علامت ناخواسته یا نا مساعدی که

در حین و یا بلا فاصله و یا ۲۴ ساعت بعد از

انتقال یک واحد خون یا فرآورده رخ می

دهد، ناشی از تزریق خون است مگر خلافتی

ثابت شود.

علائم و نشانه های یک واکنش آلرژیک، عبارتند از:

حالت تهوع

درد: درد قفسه سینه و کمردرد از علائم شایع واکنش است.

تنگی نفس: مشکل در تنفس می تواند در واکنش های شدید ظاهر شود.

افت فشار خون: فشار خون در برخی موارد واکنش به خون

کمتر از حد نرمال است.

درد پهلوی: اختلال عملکرد کلیه می تواند دردناک باشد و به

صورت درد پهلوی ظاهر شود.