




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

واحد آموزشی و سلامت

آموزش به بیمار

ERCP



شماره سند: —	
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۱/۱۵
کد بازنگری: ۰۰۱	تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۸/۰۱/۱۵

لطفاً بعد از روشن کردن اینترنت گوشی و گرفتن دوربین گوشی
بر روی لینک زیر کلیک اطلاعات مربوط به بیماری خود را دریافت
کنید.



اسکن کنید

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplu>




در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود میتوانید به
صورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز روزهای
تعطیل به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل
فرمایید

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵ بیمارستان
منتصریه

طبقه همکف کلینیک آموزش سلامت
شماره تماس: ۳۳۲۲۹۱۹۷۳

بعد از انجام ERCP چه اقداماتی صورت میگیرد؟

- ⇐ پس از انجام ERCP فشار خون و نبض شما به طور مرتب و برای چند ساعت کنترل خواهد شد.
- ⇐ تا زمانی که پزشک و پرستار اجازه به شما نداده اند از خوردن و آشامیدن خودداری کنید
- ⇐ ۶ ساعت پس از آن میتوانید از مایعات یا غذا سبک استفاده کند، معمولاً در روز های بعد میتوانید رژیم غذایی قبلی خود برخوردار باشید
- ⇐ ممکن است دچار آزردهی گلو شوید که برای چند روز قابل انتظار است. در صورتی که قادر به دفع ادرار خود نبودید و یا دچار لرز و درد شکم و تهوع و استفراغ و مدفوع قیری و استفراغ خونی حتماً به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید



ERCP

- ⇐ بررسی مجاری صفراوی با آندوسکوپی که بتواند وضعیت مجاری صفراوی و مجاری پانکراس را برای مامشخص کند. یا به عبارت دیگر تصویر برداری از مجاری صفراوی و پانکراس از طریق آندوسکوپ را به صورت اختصار ERCP مینامند.
- ⇐ در این عمل ماده حاجب از طریق آندوسکوپ به داخل مجرای صفراوی تزریق و سپس تصویر برداری انجام می شود.

ERCP در چه مواردی انجام میشود؟

- ⇐ سنگ های صفراوی که در مجاری صفراوی اصلی به دام افتاده باشند.
- ⇐ در تومور مجرای صفراوی برای گذاشتن استنت یا فنر انجام می شود.
- ⇐ در موارد پانکراتیت (التهاب پانکراس) و کلانژیت (التهاب مجاری صفراوی) صورت می پذیرد.

علامت بالینی انسداد مجاری صفراوی چیست؟

درد بالای شکم با علت نامشخص بخصوص اگر با زردی پوست و تیره شدن رنگ ادرار همراه باشد..

چه مواردی قبل از ERCP باید رعایت شود؟

- ⇐ از ۸ ساعت قبل از انجام ERCP ناشتا باشید.
- ⇐ پزشک معالج را در جریان داروهایی که مصرف می کنید قرار دهید (به خصوص داروهای ضد انعقادی مانند آسپرین، پلاویکس، وارفارین، ریواروکسابان) زیرا ممکن است نیاز باشد از چند روز قبل طبق صلاحدید پزشک معالج موقتا قطع گردد.
- ⇐ حساسیت های دارویی خود را با پزشک درمیان بگذارید.
- ⇐ دستوراتی که پزشک به شما می دهد را با دقت اجرا کنید.
- ⇐ بانوان محترم در صورتی که باردار هستند حتما این مساله را با پزشک مطرح سازند.
- ⇐ در روز انجام ERCP یک نفر همراه داشته باشید.
- ⇐ شب قبل از ERCP حدود ساعت ۶ به داز ظهر شام سبک بخورید.
- ⇐ جواب آزمایش خون و سایر مدارک موجود را حتما با خود همراه داشته باشید.
- ⇐ در صورتی که مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی هستید موافقت کتبی متخصص قلب یا ریه را همراه خود بیاورید.
- ⇐ لباس سبک و بدون دکمه فلزی بپوشید.
- ⇐ قبل از ERCP فراموش نکنید که مثانه خود را تخلیه کنید.



حین انجام ERCP چه اقداماتی انجام می شود؟

- ⇐ شما بر روی یک تخت رادیوگرافی قرار خواهید گرفت.
- ⇐ در حین انجام این اقدام نبض و فشار خون شما کنترل خواهد شد.
- ⇐ برای اینکه در طی عمل کمتر احساس ناراحتی کنید برای شما یک آرام بخش تجویز خواهد شد.
- ⇐ جهت باز نگه داشتن دهان و حفاظت از دندان های شما یک محافظ دهانی استفاده می شود.
- ⇐ در طی انجام عمل شما قادر به صحبت کردن نخواهید بود. اما مشکلی در نفس کشیدن نخواهید داشت.
- ⇐ یک آنژیوکت که بر روی دست چپ شما تعبیه می شود. و داروهایی به منظور آرامش و شل شدن عضلات دستگاه گوارش دریافت خواهید کرد.
- ⇐ پزشک لوله باریکی از طریق آندوسکوپ به سمت مجاری صفراوی هدایت خواهد کرد. و از طریق آن ماده حاجب را به داخل مجرای صفراوی تزریق کرده و عکس از زوایای مختلف تهیه خواهد کرد.
- ⇐ بعد از عکس برداری برش کوچکی در حد چند میلی متر در ابتدای مجاری صفراوی داده می شود. که بتوانند سنگ گیر افتاده را خارج کنند.
- ⇐ به ندرت این اقدام می تواند عوارضی شامل خونریزی، سوراخ شدگی روده و التهاب پانکراس (پانکراتیت) ایجاد نماید، که احتمال وجود این عوارض بسیار کم است .
- ⇐ این عوارض بین ۲ تا ۲۰ درصد احتمال اتفاق افتادن دارد که میتواند خفیف و شدید باشد