




آموزش به بیمار

عفونت ریوی (پنومونی)



شماره سند: ۱۱۱/ت-۳۲- پ	
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
کد بازنگری: ۱	تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۶/۰۵/۲۰

چقدر زمان می برد تا بهتر شوید؟

اکثر افراد ۴ تا ۷ روز بعد از شروع دریافت دارو شروع به بهتر شدن می کنند. اگر شما این احساس را نداشتید، پزشک ممکن است داروی متفاوت یا داروی وریدی به شما بدهد.

آیا پنومونی قابل پیشگیری است؟

با مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای که پزشک برای شما تجویز کرده، تا حدودی می توان از این بیماری پیش گیری کرد.



لطفاً بعد از روشن کردن اینترنت گوشی و گرفتن دوربین گوشی بر روی لینک زیر کلیک اطلاعات مربوط به بیماری خود را دریافت کنید

منبع: UpToDate

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید به صورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجای روزهای تعطیل به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمایید


آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵ بیمارستان منتصریه

طبقه همکف کلینیک آموزش سلامت

شماره تماس: ۳۳۲۲۹۱۹۷۳


بعضی از افراد می توانند داروها را در منزل استفاده

کنند اما بسیاری از بیماران نیازمند درمان در بیمارستان هستند.



بیمارانی که در بیمارستان درمان می شوند ممکن است داروهای خود را از طریق وریدی (یک لوله نازک که به رگ می رود) دریافت کنند.

بعضی از افراد نیز ممکن است اکسیژن اضافه دریافت کنند تا به آنها برای تنفس راحت تر کمک کند.



افرادی که خیلی سخت نفس می کشند ممکن است با دستگاه تنفس که ونتیلاتور نام دارد، تحت درمان قرار گیرند.

پمفلت پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.



پنومونی پنوموسیتیس چیست؟


پنومونی پنوموسیتیس (PCP) نیز نامیده می شود) یک عفونت ریوی است که باعث سرفه، تب، و مشکل تنفسی می شود و توسط یک قارچ ایجاد می گردد.

این بیماری بیشتر افرادی را درگیر می کند که به هر دلیلی سیستم ایمنی ضعیفی دارند مثل بیماران دریافت کننده پیوند که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند.



نشانه های پنومونی پنوموسیتیس چیست؟

- تب
- سرفه (اکثراً سرفه خشک و بدون خلط)
- مشکلات تنفسی
- احساس خستگی بیش تر از حد معمول
- لرز
- درد قفسه سینه به ویژه هنگام تنفس عمیق
- از دست دادن وزن بدون تلاش و فعالیت



پنومونی پنوموسیتیس چگونه تشخیص داده می

شود؟

پزشک یا پرستار خود را از وجود علائمی که گفته شد، آگاه کنید



ممکن است تست های تشخیصی مثل

رادیوگرافی (عکس برداری) قفسه سینه و سی تی

اسکن برای تشخیص عفونت در ریه درخواست

شود. همچنین ممکن است آزمایشات دیگری هم

مثل آزمایش خون و آزمایش بر روی مایع ریه شما نیز

لازم باشد.



پنومونی پنوموسیتیس چگونه درمان می شود؟

این بیماری با داروهای ضد قارچ که عامل بیماری است، درمان می شود؛ مثل سولفامتوکسازول (کوتریموکسازول)، آتواکون (مروپن) و سایر داروها.

بسته به وضعیت شما ممکن است پزشک برای کمک به بهبود

بیشتر ریه، داروهای استروئیدی مثل متیل پردنیزلون نیز تجویز

کند. استروئیدها به کاهش التهاب ریه کمک می کنند.

