





آموزش به بیمار

سوند دبل جی



شماره سند: ۱/۱۰۲-ت/۳۲- پ		
تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵	
کد بازنگری: ۰۰۳	تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵	



سوندهای حالب بشکل دابل جی. این سوندها را می‌توان توسط وسایل مخصوصی به راحتی در کلیه گذاشت و سپس در موعد مقرر خارج کرد. حالت جی در هر دو انتها از خروج سوند از حالب و مثانه جلوگیری می‌کند.

**لطفاً بعد از روشن کردن اینترنت گوشی و گرفتن دوربین گوشی
برروی لینک زیر کلیه اطلاعات مربوط به بیماری خود را دریافت
کنید**



منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود می‌توانید به صورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز روزهای تعطیل به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمایید

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵ بیمارستان منتصریه
طبقه همکف کلینیک آموزش سلامت
شماره تماس: ۳۳۳۲۹۱

آموزش بعد از خروج سوند دبل جی:

○ بعد از خروج سوند دبل جی مثانه را از ادرار تخلیه کنید

○ در صورت احساس سوزش و یا درد در چند نوبت اول پس از خروج و حین ادرار کردن نگران نباشید ممکن است با توجه به خروج سوند مسیر خروج سوند کمی آسیب دیده شده است ولی نگران کننده نمی‌باشد.

○ در صورت وجود مقدار کمی خون در ادرار ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از خروج سوند ایرادی ندارد ولی در صورت ادامه حتماً با پزشک خود و یا بخش تماس گرفته شود.

○ در صورت علائم تب و یا قطع ادرار بعد از خروج سوند حتماً به بیمارستان مراجعه کنید.

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماران می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.



سوند دبل جی سوندی است که در حین عمل پیوند کلیه جراح جهت جلوگیری از بسته شدن و ایجاد چسبندگی در مجرای ادراری و برای تخلیه ادرار از کلیه به مثانه به صورت موقت تعبیه میکند

سوند دبل جی حداقل باید ۴ تا ۶ هفته (۳۰ تا ۴۰ روز) در بدن شما باقی بماند حتما به تاریخ تذکر داده شده توسط کادر درمان جهت خروج سوند توجه فرمایید.

در صورت عدم توجه شما به خروج این سوند ممکن است اطراف این لوله (سوند) سنگ تشکیل شود و یا دچار عفونت کلیه و دستگاه ادراری شوید.



در حین داشتن سوند دبل جی از دویدن و جست و خیز یا کارهای سنگین پرهیز نمایید زیرا ممکن است دچار خونریزی ادرار و سوزش شدید شوید.



در صورت شدید بودن خون در ادرار ابتدا چند ساعت استراحت کنید و مایعات بیشتری مصرف نمایید.



در صورت عدم بهبود با پزشک خود یا بیمارستان با کلینیک آموزش سلامت تماس بگیرید.

سعی کنید به هیچ عنوان ادرار خود را نگه ندارید و حتی بدون احساس دفع هر دو ساعت یکبار به تخلیه مثانه اقدام نمایید.

آمادگی جهت خروج سوند دبل جی :

شب قبل از تاریخ تعیین شده حتما با بخش پیوند تماس گرفته شود تا با جراح مربوطه هماهنگی لازم انجام گردد.

بعد از هماهنگی حتما استحمام و شیو ناحیه عمل انجام شود.

عمل با بی حسی موضعی انجام میگردد و نیازی به بیهوشی نیست ولی لازم است بیمار ناشتا در ساعت ۷ صبح در بیمارستان حضور داشته باشد.

(داروهای بیمار باید حتما در ساعت مقرر استفاده شود)

