



گروه هدف
مراجعین و بیماران

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

واحد آموزش و سلامت

آموزش به بیمار

تاکرولیموس

(پروگراف، کوگراف، سوپرانگ یا ادوگرافت)



شماره سند ۱۴۰۱۴/ت-۳۲-پ			
تاریخ صدور:	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	تاریخ بازنگری:	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کد بازنگری:	۰۵	تاریخ بازنگری مجدد:	۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سطح خونی تاکرولیموس بر اساس نوع پیوند، مدت زمان سپری شده از پیوند و پروتکل هر تیم پیوند متفاوت است و علل زیادی در این تفاوت ها نقش دارد و جذب دارو با توجه به شرایط مختلف متفاوت است یعنی با توجه به وجود غذا و نوع غذا جذب دارو متفاوت میشود به همین دلیل پیشنهاد می شود:

بیماران پیوندی مصرف کننده تاکرولیموس ترجیحا داروی خود را بافاصله از غذا دریافت کنند.



لطفا بعد از روشن کردن اینترنت گوشی و گرفتن دوربین گوشی برروی لینک زیر کلیک
اطلاعات مربوط به بیماری خود را دریافت کنید



منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

در صورت سوال یا مشکل در زمینه بیماری خود میتوانید به صورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز روزهای تعطیل به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمایید

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵ بیمارستان منتصریه
طبقه همکف کلینیک آموزش سلامت
شماره تماس: ۳۳۳۲۹۱۹۷۳

زمان اندازه گیری سطح دارو:

اندازه گیری غلظت خونی دارو در بدن در یک فاصله ای که ۱۲ ساعت از مصرف داروی پروگراف گذشته باشد باید اندازه گیری گردد. یعنی قبل از خوردن دوز صبحگاهی باید نمونه خون گرفته شود

و سپس دارو خورده شود. آزمایش سطح نیاز به ناشتایی یا قطع سایر داروها ندارد

طریقه نمونه گیری

این آزمایش پس از پیوند جهت تنظیم دوز دارو بسیار مهم است اگر سطح دارو خیلی کم و یا زیاد باشد باعث رد پیوند یا عوارض دارویی میگردد.

سطح دارو در طول زمان تغییر میکند اما معمولا ۳ تا ۶ ماه پس از پیوند بالا است این سطح ممکن است در طول زمان کاهش داشته باشد.



عوارض جانبی داروها

- ۱- سردرد، لرزش، بی خوابی، تغییر خلق
- ۲- اسهال، استفراغ، تهوع، یبوست، بی اشتها، درد شکم
- ۳- کم شدن ادرار، عفونت ادراری
- ۴- تب، کمر درد
- در صورت مصرف داروهای ضد قارچ و ضد تشنج پزشک خود را در جریان بگذارید
- ۵- در خلال مصرف این دارو از تجویز واکسن های زنده (شامل سرخک، اوریون، سرخجه، فلج اطفال، ب، ث، ژ و تب زرد) خودداری کنید.
- ۶- در صورتیکه فردی واکسن تزریق میکند تا ۴۸ ساعت و در صورت واکسن فلج اطفال خوراکی تا ۱۴ روز با بیمار تماس نداشته باشد.

لطفا در صورت بروز لرزش، ضایعات پوستی، اسهال، استفراغ، کاهش حجم ادرار و تنگی نفس هرچه سریعتر آن را به پزشک معالج اطلاع دهید

*خانم ها باید در خلال مصرف این دارو از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمایند. زیرا باعث نقص جنینی می گردد.

*در ضمن چون این دارودر شیر مادر ترشح می شود، در حال مصرف دارو از شیر دادن اجتناب نمایید.

*لازم است در خلال مصرف این دارو پزشک عملکرد کلیه اوره و قند خون شما را به طور منظم، کنترل نماید.

گاهی بنا بر صلاحدید پزشک معالجتان، باید سطح دارو را در خونتان اندازه گیری نمایید.

عواملی که میتوانند سطح مقاومت داروی پروگراف را تغییر دهد عبارتند از:

تاثیر بعضی داروهای دیگر
مصرف داروها با شکم خالی
مصرف گریپ فروت، انار و داروهای گیاهی



مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.



شکل دارو: کیسول

میزان دارو: ۰.۵ و یا ۱ میلی گرم، ۲ میلی گرم

اثر دارو: این دارو با ضعیف کردن سلول های خاصی در سیستم ایمنی، باعث جلوگیری از رد پیوند می شود.

روش مصرف:

این دارو به فواصل هر ۱۲ ساعت یک بار تجویز می شود میزان مصرف دارو بسته به نظر پزشک است و ممکن است در طول زمان کم یا زیاد شود. بهتر است که دارو را با معده خالی مصرف نمایید.