



آموزش به بیمار

نشانه های رد پیوند کبد



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

راههای پیشگیری از رد پیوند

عوارض مثل رد پیوند، عفونت و عود بیماری و.... اغلب اتفاق می افتد که در صورت عدم درمان عضو از بین میرود ولی با ویزیت منظم تیم پیوند و تشخیص و درمان مناسب و داروهای پیشگیری کننده این عوارض تا حدودی قابل کنترل می باشد
داروهای جدید برای جلوگیری از عود بیماری و رد پیوند باعث بهبود نتایج پیوند و افزایش طول عمر بیمار شده است .



منبع:

www.nursingconsult.com/
مبانی پایه و کاربردی پیوند کبد

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دظ-۳۰۰۶

www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

افزایش آنزیمهای کبدی

هرگونه افزایش مقاوم و شدید آنزیم کبدی می تواند نشانه ای از رد پیوند، گرفتگی عروق، آسیب شریان کبد، عوارض صفراوی، عفونت ها و مسمویت دارویی باشد که نیاز به تشخیص و تایید به وسیله آزمایشات و نمونه برداری از کبد، سونوگرافی، سی تی اسکن و..... دارد

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارستان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید .



بعد از پیوند لازم است تا با مصرف داروهایی سیستم ایمنی بدن شما تغییراتی پیدا نماید سیستم ایمنی وسیله دفاعی بدن است و بدن را در برابر هرگونه عامل خارجی مثل میکروب یا ویروس محافظت میکند . از طرفی دیگر مصرف این داروها احتمال بروز عفونت را در بدن زیاد میکند بنابر این شایع ترین عوارض احتمالی متعاقب پیوند پس زدن پیوند میباشد از زمان ترخیص از بیمارستان بیمار و خانواده ی بیمار باید مراقب علائم یا نشانه های بروز این عوارض باشند در صورت بروز این علائم و نشانه ها سریعاً آن را به پزشک خود اطلاع دهید حتی اگر حال عمومی شما خوب باشد شاید لازم باشد تا با آزمایش خون یا معاینات بیشتر توسط پزشک احتمال بروز عارضه عفونت یا پس زدن پیوند بررسی شود:

علائم شامل :

- تب <
- خستگی و ضعف غیر معمول <
- افزایش وزن ناگهانی <
- گلو درد <
- تنگی نفس <
- سرفه مداوم <
- خلط سینه <
- تبخال اطراف دهان و بینی <
- درد یا سوزش موقع ادرار کردن <
- قرمزی ، تورم یا درد در هر قسمت از پوست بدن <
- علائم سرما خوردگی <
- تهوع <
- استفراغ <
- اسهال <



تب

درجه حرارت بیشتر از ۳۸ درجه با یا بدون لرز در بیماران با ضعف سیستم ایمنی جدی می باشد گاهی تب اولین نشانه رد پیوند می باشد و در بیشتر اوقات عفونت با تب مشخص می شود در اکثر موارد بیماران جهت بررسی آزمایشگاهی ، تصویر برداری و دریافت آنتی بیوتیک نیاز به بستری دارند .

