




دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش به بیمار

آمادگیهای لازم برای انجام

تستهای رادیولوژی ۲



معاونت درمان

مدیریت پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

پس در صورت حساسیت به هر چیزی حتما پزشک خود را در جریان بگذارید.

۴- حتما جهت تهیه داروی ماده حاجب ، سرنگ ، اسکالپ وین ، داروی ضد حساسیت و مسهل و راهنمایی بیشتر ، روز قبل به پزشک مراجعه کرده و نسخه این اقلام را از پزشک خود بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت معاونت درمان :

<http://v-darman.mums.ac.ir/index.php/nursing-management/nursing-management/86-nursing-management/nursing-management/877-self-care-education?showall=&start=2>

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی ، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دخطی-۳۰۰۶

www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

۱- به اطفال در شروع آزمایش نوشابه های گازدار

بخورانید تا باعث انقباض معده شده و تصاویر کلیه ها پس از تزریق ماده حاجب در زمینه تیره معده به خوبی قابل بررسی باشد.

۲- در افرادی که عملکرد فیزیولوژیکی کلیه های آنها طبیعی است بهتر است تا چند ساعت قبل از انجام این تست مایعات ننوشند.

۳- در بیمارانی که سابقه حساسیت نسبت به بعضی از غذاها مانند ماهی ، میوه ها و بعضی داروها مثل پنی سیلین دارند ، تجویز داروهای ضد حساسیت مانند آمپول هیدرو کورتیزون قبل از تزریق ماده حاجب ضروری است و باید از داروهای حاجب با فشار اسمزی پایین و غیر آیونی مانند امینیپاک استفاده کرد.

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.



آمادگی لازم جهت تصویر برداری از سیستم

ادراری

(IVP)

قبل از انجام این تست نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱- اندازه گیری وزن قبل از آزمایش جهت تعیین

میزان داروی حاجب .

۲- چند لحظه قبل از انجام تست مثانه خود را خالی

کنید.

۳- از عدم بارداری خود اطمینان حاصل کنید.

۴- اگر سابقه حساسیت غذایی و دارویی دارید و یا

سابقه ابتلا به بیماری خاصی مثل آسم، دیابت،

هپاتیت، ایدزو... دارید حتما به پزشک اطلاع دهید.

۵- پس از اتمام عکس برداری رنگی و مراجعه به منزل

مایعات مصرف نمایید تا دارو از طریق ادرار دفع شود.

۶- در بدن شما هیچ ماده رادیواکتیو و تشعشعی باقی

نخواهد ماند. نگران نباشید.

۷- شب قبل از تصویر برداری ساعت ۹ شب، یک شام

مختصر مثل سوپ میل کنید و یک شیشه ۴۰ گرمی روغن

کرچک را با آب ولرم رقیق کرده میل نمایید و تا ساعت

۱۲ شب مایعاتی مثل آب و چای و آب پرتقال می توانید

بنوشید و لی از ۱۲ شب به بعد چیزی نخورید.

۸- صبح ساعت ۹:۳۰ ناشتا با داروهایی که از قبل نسخه

شده و تهیه کرده اید به رادیولوژی مراجعه نمایید.

۹- حتما یک همراه داشته باشید.



ارو گرافی ترشحي

(IVU)

برای تخلیه مواد دفعی و گاز از روده ها در اغلب

تستهای رادیولوژی از مسهل روغنی مثل روغن

کرچک به مقدار ۴۰ گرم عصر روز قبل از آزمایش

استفاده میشود.

از دو تا سه روز قبل از آزمایش بهتر است رژیم

غذایی کم حجم داشته باشید و از مسهل ملایم مانند

قرص بیزاکودیل دو تا سه عدد قرص در روز استفاده

کنید .

از نیمه شب قبل از روز آزمایش ناشتا بمانید.

در مواردی که قادر به خوردن مسهل نیستید ، از

شیاف بیزاکودیل استفاده کنید .

در مورد بیماران بستری از تنقیه آب و روغن استفاده

میشود و در کودکان و بیمارانی که اسهال دارند نیاز

به مصرف مسهل نیست.

قبل از انجام این تست کارهای زیر را انجام دهید: