



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش به بیمار

آمادگیهای لازم برای انجام

تستهای رادیولوژی



معاونت درمان

مدیریت پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

عکس رنگی روده (Barium Enema)

این گرافی جهت بررسی روده بزرگ انجام میشود و روده ها باید تا حد امکان پاک و عاری از مواد دفعی باشند.

باریم انما به دو روش انجام میشود:

۱- فقط روده ها با باریم پر میشوند

۲- روده ها ابتدا با باریم و سپس با هوا پر میشوند

شب قبل از انجام رادیوگرافی حدود ساعت ۱۹:۳۰ یک شام سبک و ساده میل شود. ترجیحا بدون حبوبات بوده و نفاخ نباشد.

۲- یک شیشه روغن کرچک کامل میل شود. در صورت عدم تحمل روغن کرچک میتوان از ۳ عدد قرص بیزاکودیل استفاده کرد.

۳- نیم ساعت بعد از خوردن روغن ، ۴ عدد قرص دایمتیکون هر ۱۵ دقیقه یک عدد قرص جویده شود. حتما قبل از آمدن به رادیولوژی نسخه داروها و وسایل مورد نیاز را از پزشک دریافت کرده و آنها را تهیه بفرمایید.



با ما همراه باشید در سایت معاونت درمان :

<http://v-darman.mums.ac.ir/index.php/nursing-management/nursing-management/86-nursing-management/nursing-management/877-self-care-education?showall=&start=2>

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دخطی-۳۰۰۶

www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

عکس برداری از مری (Barium Swallow)

در این آزمایش نیازی به آماده بودن و ناشتا بودن

نیست. فقط این آزمایش نباید بلافاصله بعد از

خوردن یک غذای سنگین انجام بگیرد چون قورت

دادن باریم غلیظ در حین آزمایش باعث تهوع و

ایجاد ناراحتی برای شما خواهد کرد.

پس بهتر است قبل از انجام آزمایش پر خوری نکنید.

در این رادیوگرافی از پودر سولفات باریم برای

نشان دادن مری استفاده میشود.

جهت کودکان حتما شیشه یا سرنگ به همراه داشته

باشید.

وجود دونفر جهت نگه داشتن کودک و کمک به

تکنولوژیست لازم است.



مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را باز یابید .



آمادگی جهت انجام عکس از کلیه

حالب - مثانه

(K.U.B)

۱- شب قبل از انجام رادیوگرافی ساعت ۱۹:۳۰ یک شام سبک میل شود .بهتر است غذا بدون حبوبات بوده و نفاخ نباشد.

۲- یک شیشه روغن کرچک کامل میل شود. در صورت عدم تحمل روغن کرچک میتوان از ۳ عدد قرص بیزاکودیل استفاده کرد.

۳- نیم ساعت بعد از خوردن روغن هر ۱۵ دقیقه یک عدد قرص دایمتیکون جویده شود تا چهار عدد قرص.

۴- آب و مایعات گرم فراوان نوشیده شود (بجز شیر و نوشابه)

۵- صبح ناشتا راس ساعت ۹:۳۰ به رادیولوژی مراجعه فرمایید.

آمادگی جهت عکس مهره های کمری و

استخوان خاجی

(Lumbar & Lumbosacral)

۱- شب قبل از انجام رادیوگرافی حدود ساعت ۱۹:۳۰ یک شام سبک و ساده میل شود. ترجیحا بدون حبوبات بوده و نفاخ نباشد.

۲- یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی را با آب ولرم رقیق کرده و نیم ساعت بعد از صبحانه به طور کامل میل شود.

در صورت عدم تحمل روغن کرچک میتوان از ۳ عدد قرص بیزاکودیل استفاده کرد.

۳- نیم ساعت بعد از خوردن روغن ، ۴ عدد قرص دایمتیکون هر ۱۵ دقیقه یک عدد قرص جویده شود.

۴- آب و مایعات گرم فراوان نوشیده شود (بجز شیر و نوشابه)

۵- صبح ناشتا راس ساعت ۹:۳۰ به رادیولوژی مراجعه فرمایید.

عکس برداری از معده و اثنی عشر

(U.G.I)

بهتر است از نیمه شب حدود ساعت ۹ شب چیزی نخورید و کاملا ناشتا باشید.

مدت زمان خالی بودن معده از غذا و مایعات حداقل باید ۸ تا ۱۰ ساعت باشد.

حتی از کشیدن سیگار و جویدن آدامس هم خودداری کنید . در غیر این صورت ترشح غدد ترشحاتی معده باعث بوجود آمدن مایع در معده شده و در نتیجه باعث میشود که تخلیه معده دچار تاخیر شود.

درمورد کودکان حتما شیشه شیر خالی و سرنگ به همراه داشته باشید و وجود دونفر همراه جهت کنترل کودک و کمک به رادیولوژیست الزامی است.

