



التثقيف الصحي

ماهو دواء نيوبوجين (GCSF)



الرجاء بعد تشغيل الانترنت في الموبايل و وضع كاميرا الموبايل على الرابط التالي، يمكنك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمرضك.



مصدر : <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل بخصوص مرضك، يمكنك سؤالنا عبر الواتساب على الرقم 09366059181

مستشفى منتصرية فوق التخصصي لزراعة الأعضاء و غسيل الكلى
العنوان: مشهد، أوتوستراد الإمام الخميني، إمام خميني 25



رقم الوثيقة: ١/٠٢٨-ت/٢٣-م	تاريخ الإصدار : 2023/8/21
تاريخ المراجعة : 2024/8/21	كود المراجعة : ٠٠١

التحذيرات:

يجب تناوله بحذر من قبل مرضى القلب و الأمراض الالتهابية .
ليس هناك مشكلة في أخذه من قبل الأطفال بعمر بين 0 إلى 6 سنوات، و من قبل الأشخاص الذين يمارسون القيادة، أو الأعمال الشاقة. لم يتم إثبات عدم خطورة هذا الدواء على النساء الحوامل أو المرضعات .

الاستعمال طويل الأمد :

الاستعمال طويل الأمد لهذا الدواء يزيد بشكل طفيف من خطر سرطان الدم ، و التهاب الأوعية الدموية في الجلد (Vasculitis)، هشاشة العظام، ضعف الشعر، تضخم الطحال و الكبد، و النزيف الناجم عن نقص عدد الصفيحات الدموية.

المرضى العزيز

إن المحتوى الموجود أمامك يشمل مواضيع تثقيفية تخص رعايتك خلال مرضك. نرجو أن تستعيد عافيتك من خلال اتباع النصائح المقدمة فيه .



نيوبوجين هو نوع من البروتين الطبيعي و هو عامل النمو المولد لكريات الدم البيضاء.

نقص بروتين نيوبوجين يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات البكتيرية. هذا الدواء يحفز نقي العظم على إنتاج كريات الدم البيضاء، و بالتالي يقلل من خطر الالتهاب و العدوى، و يساهم في انتقال هذه الخلايا من نقي العظم إلى الدم، لتتجمع في الدم، و يحصل علاج نقي العظم، أو ليكون بديلاً لنقي العظم المفقود طيلة فترة علاج السرطان المتقدم .

يوصف نيوبوجين لعلاج المرضى الذين يعانون من نقص خلايا الدم، و بعض مرضى الإيدز، و الأشخاص الذين تلقوا كنية كبيرة من العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي خلال عملية زراعة نقي العظم أو لعلاج السرطان.

هؤلاء المرضى أكثر عرضة لخطر الإصابة بالالتهابات المتكررة و الشديدة.

الألم العظمي هو أحد الأعراض الشائعة للعلاج بعقار نيوبوجين، و يمكن السيطرة على الألم بتناول مسكنات الألم.

إذا تم إعطاء هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات الدموية النادرة، يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان الدم (لوكيميا).

التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً :

○ ألم العضلات و العظام .

التأثيرات الجانبية النادرة :

الآفات الجلدية
الغثيان و الإسهال.



شكل الدواء : حقنة.

الجرعة و أوقات الاستعمال: مرة يومياً.

الجرعة للبالغين : 5 – 12 ميلي غرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم و بحسب نوع المرض و استجابة الجسم.

بدء الفعالية الدوائية : بعد 24 ساعة.

استمرار التأثير الدوائي : يومين تقريباً.

حفظ الدواء :

يحفظ في عبوة مغلقة، داخل الثلاجة، في مكان بارد و جاف و بعيداً عن متناول الأطفال و بعيداً عن الضوء.

